

Probleme rezolvate cu ajutorul ecuațiilor și sistemelor de ecuații.

Pentru a rezolva o problemă cu ajutorul ecuațiilor sau a sistemelor, se parcurg următoarele etape:

- stabilirea datelor cunoscute și a celor necunoscute din problemă
- alegerea necunoscutei și exprimarea celorlalte date în funcție de această necunoscută
- stabilirea legăturilor între aceste date (adică formarea ecuației sau a sistemului)
- rezolvarea ecuației

Aplicații

1. După morăre, cu 20% a prețului său, un obiect costă 432 lei. Care a fost prețul initial?

Rezolvare:

* - prețul obiectului

$$x + 20\% \cdot x = x + \frac{20}{100}x = x + \frac{1}{5}x = \frac{5x}{5} + \frac{x}{5} = \frac{6x}{5}$$

prețul obiectului
după morăre

$$\frac{6x}{5} = 432 \text{ ecuație problemei}$$

$$6x = 2160 \Rightarrow x = \frac{2160}{6} \Rightarrow x = 360 \text{ lei}$$

2. După ce un obiect s-a ieftinit cu 15%, acesta costă 1020 lei. Care a fost prețul initial?

Rezolvare:

$$* - \text{prețul initial al obiectului}$$

$$x - 15\% \cdot x = x - \frac{15}{100}x = \frac{100x - 15x}{100} = \frac{85x}{100} = \frac{17x}{20}$$

prețul obiectului
după ieftinire

$$\frac{17x}{20} = 1020 \text{ ecuație problemei}$$

$$\frac{17x}{20} = 1020 \Rightarrow 17x = 1020 \cdot 20 \Rightarrow x = \frac{1020 \cdot 20}{17} = 1200$$

$x = 1200$ lei

3. Într-o clasă sunt 27 de elevi, iar numărul fetelor este dublu numărului băieților. Câte fete și cotați băieți sunt în clasă.

- b - numărul băieților
f - numărul fetelor

$$\begin{cases} b + f = 27 \\ f = 2b \end{cases} \quad - \text{sistemul problemei}$$

$$b + 2b = 27$$

$$3b = 27$$

$$b = 9$$

$$f = 2 \cdot 9 = 18$$

4. Suma a 3 numere este 1032. Afleți numerele, știind că al doilea este triplu primului număr, iar al treilea este cu 60 mai mare decât jumătate din primul număr.

Răsolvare:

- a - primul număr
b - al doilea număr
c - al treilea număr.

$$b = 3a$$

$$c = 60 + \frac{a}{2}$$

$$\frac{2}{3}a + 3a + 60 + \frac{a}{2} = 1032 \quad - \text{ecuație problemei}$$

$$2a + 6a + 120 + a = 2064$$

$$9a = 2064 - 120$$

$$9a = 1944 \Rightarrow a = \frac{1944}{9} = 216$$

$$\left| \begin{array}{l} a = 216 \\ b = 3 \cdot 216 = 648 \\ c = 60 + 108 = 168 \end{array} \right.$$

5. Află 2 numere naturale, astăzi și diferența lor este egală cu 747 și că, împărțind unul cu celălalt, obținem cotașul 6 și restul 37.

Răsolvare:

Amintim teorema împărțirii cu rest:

Dacă ar fi $a, b \in \mathbb{N}$, astăzi $c, r \in \mathbb{N}$ astfel încât $a = b \cdot c + r$, unde $r \geq 0$ și $r < b$.

a - deîmpărțit
 b - împărțitor
 c - cotaș
 r - rest.

a - primul număr

b - al doilea număr

$$\begin{cases} a - b = 747 \\ a = b \cdot 6 + 37 \end{cases} \text{ sistemul problemei}$$

Înlocuim în prima ecuație \Rightarrow

$$6b + 37 - b = 747$$

$$5b = 710$$

$$b = \frac{710}{5} = 142$$

$$a = 6 \cdot 142 + 37 = 852 + 37 = 889$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 889 \\ b = 142 \end{cases}$$

6. Suma a 4 numere consecutive este egală cu 110.

Află cel mai mic număr.

Răsolvare:

x - cel mai mic număr

$$x + (x+1) + (x+2) + (x+3) = 110 \quad \text{ecuație problemei}$$

$$x + x+1 + x+2 + x+3 = 110$$

$$4x = 104 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{104}{4} = 26$$

7. După o creștere consecutivă de preturi, prima de 15% , apoi o doară de 20% , un obiect costă 745,2 lei. Care a fost prețul inițial al obiectului înainte de cele 2 creșteri consecutive.

Răsolvare:

x = prețul inițial al obiectului

$$x + 15\% \cdot x = x + \frac{15}{100}x = \frac{115x}{100} = \frac{23x}{20}$$

pretul obiectului după prima creștere

$$\frac{23x}{20} + 20\% \cdot \frac{23x}{20} = \frac{23x}{20} + \frac{20}{100} \cdot \frac{23x}{20} =$$

$$\frac{23x}{20} + \frac{23x}{100} = \frac{115x}{100} + \frac{23x}{100} = \frac{138x}{100}$$

pretul obiectului după cea de-a doua creștere

$$\frac{138x}{100} = 745,2 \quad \text{rezolvare problema}$$

$$138x = 74520$$

$$x = \frac{74520}{138} = 540 \text{ lei}$$

8. Într-un bloc sunt 48 de apartamente cu două și respectiv, trei camere. Cele apartamente sunt din fizice fel, deci sunt în total 112 camere.

Răsolvare:

x - numărul de apartamente cu 2 camere

y - numărul de apartamente cu 3 camere

$$\begin{cases} x + y = 48 \\ 2x + 3y = 112 \end{cases} \quad \text{sistemul problemei}$$

$$\begin{cases} x + y = 48 \\ 2x + 3y = 112 \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} 96 - 2y + 3y = 112 \\ y = 16 \end{array} \right.$$

$$\begin{cases} x = 48 - y \\ 2(48 - y) + 3y = 112 \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} x = 48 - 16 = 32 \\ y = 16 \end{array} \right.$$

Toma

culegere - probleme a II-a

pag. 43 / problemele 1, 2, 4, 6, 7

pag. 44 / problemele 13, 14, 16, 20